UNIVERSITY OF COPENHAGEN

Københavns Universitet

Skove og plantager 2010

Nord-Larsen, Thomas; Johannsen, Vivian Kvist; Riis-Nielsen, Torben; Jørgensen, Bruno Bilde

Publication date:
2012

Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Nord-Larsen, T., Johannsen, V. K., Riis-Nielsen, T., & Jørgensen, B. B. (2012). *Skove og plantager 2010*. Skov & Landskab, Københavns Universitet.

Download date: 14. okt.. 2026

SKOV & LANDSKAB

Skove og plantager 2010

DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET
KØBENHAVNS UNIVERSITET

Rapportens titel
Skove og plantager 2010

Forfattere/redaktører
Thomas Nord-Larsen, Vivian Kvist Johannsen, Torben Riis-Nielsen og Bruno Bilde Jørgensen

Udgiver
Skov & Landskab
Københavns Universitet
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C

Ansvarshavende redaktør
Niels Elers Koch

Layout og dtp
Karin Kristensen

Bedes citeret
Thomas Nord-Larsen, Vivian Kvist Johannsen, Torben Riis-Nielsen
og Bruno Bilde Jørgensen (2012): Skove og plantager 2010,
Skov & Landskab, Frederiksberg, 2012. 46 s. ill.

ISBN
978-87-7903-592-8 (internet)
Rapporten udgives udelukkende elektronisk

Forsidefoto
Thomas Nord-Larsen

Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse
I salgs- eller reklameøjemed er eftertryk og citering af rapporten samt
anvendelse af Skov & Landskabs navn kun tilladt efter skriftlig tilladelse.

Forord

Danmarks Skovstatistik er baseret på stikprøvevise målinger i skov fordelt over hele Danmark. Målingerne omfatter således den samlede variation i skovenes naturgrundlag og dyrkningshistorie og danner grundlag for overvågning af skovenes tilstand og udvikling.

Skovstatistikkens design muliggør årlige opdateringer af statistiske nøgledata. Skove og plantager 2010 omfatter en opdatering af de centrale tabeller baseret på målingerne 2006-2010.

Skovstatistikken udføres for Naturstyrelsen, Miljøministeriet.

Skov & Landskab, Københavns Universitet
Frederiksberg, Juni 2012

Indhold

Forord **3**

Indhold **4**

1. Om Danmarks Skovstatistik **5**

2. Skovressourcer **7**

2.1 Skovareal 7

2.2 Vedmasse 11

2.3 Kulstof 14

2.4 Tabeller 15

3. Skovsundhed **36**

3.1 Tabeller 38

4. Biodiversitet i de danske skove **39**

4.1 Biodiversitet og skovdyrkning 39

4.2 Gamle træer og dødt ved 41

4.3 Tabeller 42

1. Om Danmarks Skovstatistik

Den første skovstatistik i Danmark blev udgivet i 1881 og indeholdt data om skovarealet og dets fordeling til træarter. Indsamling af skovstatistiske data er frem til år 2000 sket med 10-15 års mellemrum og er i dag indeholdt i Skovlovens §35 stk. 2. Heraf fremgår, at »Ministeren skal drage omsorg for, at der løbende indsamles landsdækkende statistiske data og udarbejdes rapporter om de danske skoves tilstand og udvikling«.



Figur 1.1. Prøveflader målt i Danmarks Skovstatistik i perioden 2006-2010.

Figure 1.1. Sample plots inventoried in the Danish National Forest Inventory during 2006-2010.

Ved indsamlingen af data om skovene i forbindelse med de tidligste opgørelser var fokus overvejende på skovenes areal og ressourcerne af træ. Siden dengang er efterspørgslen efter andre goder såsom beskyttelse af natur, kulturelle værdier og grundvand, rekreation og lagring af kulstof steget. Dette afspejles i den ønskede viden om skovene fra nationalt såvel som internationalt hold. For at imødekomme dette ønske påbegyndte

Skov & Landskab i 2002 en årlig indsamling af data til en stikprøvebaseret skovstatistik for hele landet - Danmarks Skovstatistik. Projektet finansieres af Naturstyrelsen under Miljøministeriet.

Danmarks Skovstatistik er bygget op om et landsdækkende 2 x 2 km net. I hvert af nettets skæringspunkter er placeret en gruppe bestående af fire prøveflader i hjørnerne af et kvadrat på 200 x 200 meter. Prøvefladerne er cirkulære og har en radius på 15 meter. Det samlede antal prøveflader måles over en periode på fem år.

I den femårige målerotation 2006-2010 blev der udpeget i alt 8.973 prøveflader med skov fordelt på 3.869 grupper (se tabel 1.1). Af det samlede antal prøveflader udvalgt til måling, blev der af forskellige årsager ikke foretaget målinger på 387.

Tabel 1.1. Antal målte grupper og prøveflader i den femårige rotation 2005-2009. Skovdækkede prøveflader, der af forskellige årsager ikke er målt i felten, er angivet som manglende.

Table 1.1. Number of measured clusters and sample plots in the five year rotation 2005-2009. Forest covered sample plots not inventoried in the field are denoted »Missing«.

Årstal Year	**Grupper** Clusters			**Prøveflader** Sample plots		
	I alt Total	**Skov** Forest	**Manglende** Missing	**I alt** Total	**Skov** Forest	**Manglende** Missing
2006	2.179	717	57	8.531	1.624	187
2007	2.201	772	109	8.644	1.804	246
2008	2.212	804	2	8.644	1.893	3
2009	2.195	782	0	8.604	1.797	0
2010	2.196	793	0	8.614	1.855	0
I alt Total	10.983	3.869	168	43.037	8.973	387

2. Skovressourcer

Skovenes ressourcer omfatter skovarealet i sig selv såvel som det træ, der gror på arealet. Skovenes arealmæssige udstrækning udgør en ressource i forbindelse med beskyttelse af landbrugsjord, infrastruktur, grundvand og den biologiske mangfoldighed samt i forbindelse med dets udnyttelse til rekreative formål. Skovenes træer udgør en fornybar ressource, der anvendes til papir, møbler, gulve og bygningstømmer samt til energi primært ved afbrænding i krafvarmeværker og i private pejse og brændeovne. Yderligere binder skovenes træer store mængder af kuldioxid (CO_2) som en del af fotosyntesen. En vis del af det optagne kulstof (C) indgår i træernes biomasse og lagres, hvorved atmosfærens indhold af drivhusgassen CO_2 mindskes

2.1 Skovareal

På baggrund af målingerne i perioden 2006-2010 er skovarealet opgjort til 585.607 ha eller ca. 13,6 pct. af landets areal. Arealet med anden træbevoksning er opgjort til 46.994 ha eller ca. 1,1 pct. af landets areal (tabel 2.1). Således udgør det samlede træbevoksede areal i Danmark 632.601 ha eller 14,7 pct. af landets areal. De største skovarealer findes i det midtjyske område, mens den højeste skovprocent findes i Region Hovedstaden.



Figur 2.1. Skovarealet i procent af kommunernes samlede areal.

Figure 2.1. Forest area percentage for individual counties.

I forhold til de tidligere udgivelser fra Danmarks Skovstatistik er der en mindre stigning i skovarealet. En del af denne stigning skyldes skovrejsning, men en del skyldes formentlig, at en større andel af prøvefladerne end tidligere er blevet målt i felten. Endelig er der en statistisk usikkerhed på estimatet. Den sande skovprocent ligger således indenfor intervallet 13,1-14,1 pct., mens andelen af andet træbevokset areal ligger indenfor intervallet 1,0-1,2 pct.

Af det samlede skovareal er 39,4 pct. rene nåleskove, 40,6 pct. er rene løvskove og 12,0 pct. er blandede løv- og nåleskove. Juletræer fylder samlet 4,6 pct. af skovarealet, mens 3,4 pct. er midlertidigt ubevoksede arealer eller ubevoksede arealer, der indgår i skovdriften. Andelen af rene nåleskove er størst i Region Midtjylland (49,9 pct.), mens den største andel rene løvskove findes i Region Sjælland (67,2 pct.). Det er første gang siden 1923, at en opgørelse af de danske skove angiver en større andel af løvskove end nåleskove.



Figur 2.2. Fordelingen af skovarealet til arealanvendelsesklasser.

Figure 2.2. Distribution of landuse classes of the Danish forests.

Den mest almindelige træart i de danske skove er rødgran, der dækker 15,8 pct. af det samlede skovareal. Den næsthyppigste træart er bøg, der dækker 12,8 pct. Nåletræerne optager 49,3 pct. af det samlede skovareal, mens løvtræerne optager 44,9 pct. At nåletræerne i modsætning til opgørelsen af arealanvendelsesklasser optager den største andel af det samlede skovareal, når det fordeles til enkelte træarter, skyldes at der i klassen »Blandet løv- og nåleskov« er en større andel af nåletræer end løvtræer. Resten af arealet er ubevokset eller dækket af en ukendt træart, hvilket forekommer når der ikke inden for en skovbevokset prøveflade er registreret nogen træer. Andelen af løvtræ er størst i landets østlige egne, mens nåletræerne dominerer i de vestlige egne.



Figur 2.3. Fordelingen af det træbevoksede areal til træarter. Procentangivelserne er artens andel af det samlede skovareal, baseret på stammernes tværsnitsareal. Hertil kommer det ubevoksede areal (3,5 pct.) og den del af skovarealet, hvor der ikke er angivet en træart (2,4 pct.).

Figure 2.3. Distribution of the forest area to tree species. Percentages refer to the species share of the total forest area. In addition to this unstocked areas account for 3.5 pct. of the area and areas with unknown species account for 2.4 pct.



Figur 2.4. Løvtræandelen i de enkelte kommuner.

Figure 2.4. Percentage of broadleaved forest cover for individual counties.



Figur 2.5. Aldersklassefordelingen for bøg, eg, rødgran og sitkagran.

Figure 2.5. The age class distribution for beech, oak, Norway spruce and Sitka spruce.

Fordelingen af skovarealet til driftsklasser (arts- og aldersklasser) viser, at over en fjerdedel (25,2 pct.) af arealet med bøg er ældre end 100 år, mens den tilsvarende andel for eg er 8,1 pct. Til gengæld udgør andelen af bevoksninger under 20 år næsten en fjerdedel (23,1 pct.) af det samlede areal med eg.

For rødgran er andelen af bevoksninger under 10 år relativt lille (2,2 pct.), mens den største andel af bevoksningerne er 20-30 år gamle (22,3 pct.). Aldersklassefordelingen for sitkagran svarer i store træk til fordelingen for rødgran.

Den største andel af skovarealet er ejet af private (68 pct.), mens statsskovene udgør 18 pct. af det samlede skovareal. Statsskovenes andel af det samlede skovareal er størst i Region Hovedstaden (56 pct.) og mindst i Region Sjælland (6 pct.).



Figur 2.6. Fordeling af skovarealet til forskellige typer ejerskaber.

Figure 2.6. Distribution of the forest area to types of ownership.

2.2 Vedmasse

Den samlede vedmasse i de danske skove er 115,1 mio. kubikmeter svarende til 196,6 kubikmeter per hektar. Den statistiske usikkerhed på estimatet er 1992,8-200,5 kubikmeter per hektar og dermed afviger tallet ikke fra de tidligere rapporteringer. Den samlede vedmasse er størst i de skovrige egne i Midtjylland, mens vedmassen per hektar er størst i de østlige dele af landet.



Figur 2.7. Gennemsnitlig vedmasse per hektar for enkelte kommuner.

Figure 2.7. Average growing stock per hectare for individual counties.



Figur 2.8. Fordeling af vedmassen i skov til arter.

Figure 2.8. Distribution of growing stock to species.

Af den samlede vedmasse udgør løvtræet den største andel (55 pct.), mens nåletræet udgør 45 pct. Den mest vedmasserige træart er bøg, der udgør 25 pct. af den samlede vedmasse, mens rødgran udgør 18 pct.

Vedmassens fordeling til forskellige størrelser af træer giver en indikation af træernes modenhed og vedmassens potentielle anvendelse. For bøg findes 29 pct. af vedmassen i træer større end 60 cm, mens det tilsvarende tal for eg er 26 pct. Dette betyder, at op imod en tredjedel af vedmassen må anses som moden. For rødgran og sitkagran findes hhv. 6 og 16 pct. af vedmassen i træer, der er større end 40 cm og derfor må anses som hugstmoden. Årsagen til den lille andel er formentlig hyppige stormfald blandt nåletræarterne.

Hugsten i de danske skove opgøres af Danmarks Statistik og er gennem de seneste 10 år steget med 850.000 kubikmeter eller 47 pct. til over 2,5 mio. kibikmeter. Særligt mængderne af energitræ er steget og udgør i 2010 51 pct. af den samlede hugst, hvor andelen var 38 pct. i 2001



Figur 2.9. Vedmassens fordeling til diameterklasser for bøg, eg, rødgran og sitkagran.

Figure 2.9. Distribution of growing stock to diameter classes for beech, oak, Norway spruce and Sitka spruce.

2.3 Kulstof

Klimaforandringerne kan imødegås ved at reducere udledningen af bl.a. kuldioxid (CO_2) til atmosfæren fra afbrændingen af fossile brændstoffer og rydning af naturlig vegetation. Indholdet af kuldioxid i atmosfæren kan også mindskes ved skovens binding af kulstof. Skovtræerne binder kulstof i biomassen ved at optage CO_2 i forbindelse med fotosyntesen. En vis del af det optagne CO_2 indgår i træernes biomasse og lagres.

Det samlede kulstoflager i skovenes levende vedmasse (stamme, grene og rødder) er beregnet til omtrent 37,7 mio. tons, hvilket svarer til 64,3 tons per ha. Opgjort i CO_2 svarer kulstoflagret i skovene til 138,1 mio. tons. Kulstoflageret på andre træbevoksede arealer er 0,3 mio. tons kulstof. I forhold til den seneste opgørelse er lagret en smule mindre. Ændringen skyldes overvejende, at der i denne opgørelse blev anvendt en ny og mere præcis beregningsmetode til at opgøre træernes indhold af kulstof.



Figur 2.10. Fordeling af kulstoflagret til kommuner.

Figure 2.10. Geographical distribution of carbon stocks (in 1,000 tonnes).

2.4 Tabeller

Tabel 2.1. Arealet med skov og anden træbevoksning fordelt til regioner.
Table 2.1. Forest area and other wooded land area distributed to regions.

Region Region	**Skov** Forest		**Andet træbevokset areal** Other wooded land	
	Areal Area **ha**	**Andel** Percentage **pct.**	**Areal** Area **ha**	**Andel** Percentage **pct.**
Danmark	585.607	13,6	46.994	1,1
Region Hovedstaden	44.912	17,5	3.744	1,5
Region Midtjylland	207.511	15,8	17.000	1,3
Region Nordjylland	109.708	13,8	8.234	1,0
Region Sjælland	87.799	12,1	4.613	0,6
Region Syddanmark	135.677	11,1	13.403	1,1

Tabel 2.2. Skovarealet fordelt til regioner og arealanvendelsesklasser.
Table 2.2. Forest area distributed to regions and landuse classes.

Arealanvendelse Land use	**Region** Region					
	Danmark	**Hovedstaden**	**Midtjylland**	**Nordjylland**	**Sjælland**	**Syddanmark**
	ha					
I alt Total	585.607	44.912	207.511	109.708	87.799	135.677
Skov, nål Forest, conifers	230.760	12.794	103.581	52.138	15.353	46.895
Skov, løv Forest, broadleaves	237.455	25.484	58.923	33.508	58.945	60.596
Skov, blandet løv og nål Forest, mixtures of conifers and broadleaves	70.400	4.818	27.431	16.456	7.848	13.847
Juletræer Christmas trees	26.705	884	10.555	5.306	3.109	6.850
Midlertidig ubevokset Temporarily unstocked	12.931	485	4.268	2.014	1.963	4.201
Hjælpearealer Unstocked	7.354	447	2.753	286	582	3.287

Tabel 2.3. Fordeling af skovarealet til regioner og træarter.
Table 2.3. Distribution of the forest area to regions and tree species.

Art Species	**Region** Region					
	Danmark	**Hovedstaden**	**Midtjylland**	**Nordjylland**	**Sjælland**	**Syddanmark**
			ha			
I alt Total	585.607	44.912	207.511	109.708	87.799	135.677
Hjælpearealer Unstocked	7.285	447	2.753	286	582	3.287
Træbevokset Wooded area	578.322	44.465	204.758	109.422	87.218	132.390
Midlertidigt ubevokset Temporarily unstocked	12.876	485	4.268	2.014	1.963	4.201
Løvtræ Broadleaves	263.603	27.560	71.162	39.149	60.860	64.258
Bøg Beech	75.551	8.643	15.692	8.698	23.016	19.168
Eg Oak	57.217	5.509	18.237	7.166	10.652	15.636
Ask Ash	19.540	2.305	3.967	1.200	6.068	5.936
Ær Sycamore maple	21.016	1.912	4.363	2.154	7.154	5.317
Birk Birch	36.906	3.940	12.420	8.561	3.905	8.135
Andet løv Other broadleaves	53.373	5.252	16.482	11.370	10.064	10.066
Nåletræ Conifers	288.034	15.828	126.148	65.154	21.612	59.732
Rødgran Norway spruce	93.002	9.177	45.187	9.653	9.077	19.725
Sitkagran Sitka spruce	34.498	926	11.985	13.446	1.231	7.139
Andet ædelgran Other fir sp.	16.451	207	6.044	6.720	1.411	2.099
Fyrrearter Pine sp.	65.889	2.289	27.533	20.882	1.742	13.780
Nordmannsgran Nordmann fir	27.355	1.305	9.524	5.937	4.453	6.141
Nobilis Noble fir	12.916	205	6.562	2.552	1.044	2.557
Andet nål Other conifers	37.923	1.720	19.314	5.965	2.653	8.292
Ukendt Unknown	13.808	592	3.180	3.105	2.783	4.198

Tabel 2.4. Fordeling af det samlede skovareal til træarts- og aldersklasser. Aldersklasserne angiver klassens midtpunkt. Bemærk, at hver skovbevoksning er henført til én bestemt klasse, og at resultaterne derfor ikke er konsistente med artsfordelingen ovenfor.

Table 2.4. Distribution of the forest area to tree species and age classes. Classes are indicated by the class midtpoints. Note that each forest stand is attributed to a specific management class and the results are therefore not consistent with the species distribution above.

Aldersklasse Age class	**I alt** Total	**Hjælpearealer** Unstocked	**Træbevokset** Wooded area	**Midlertidigt ubevokset** Temporarily unstocked	**Løv** Broadleaves	**Bøg** Beech	**Eg** Oak	**Ask** Ash	**Ær** Sycamore maple	**Birk** Birch	**Andet løv** Other broadleaves	**Nål** Conifers	**Rødgran** Norway spruce	**Sitkagran** Sitka spruce	**Andet ædelgran** Other fir sp.	**Fyr** Pine sp.	**Nordmannsgran** Nordmann fir	**Nobilis** Noble fir	**Andet nål** Other conifers	**Ukendt** Unknown
År																				
I alt Total	585.607	7.285	578.322	12.876	261.463	81.927	59.878	20.968	18.197	39.141	41.353	290.900	97.123	33.569	16.635	63.876	28.470	13.211	38.015	13.083
.	97.107	7.285	89.822	12.876	49.567	14.185	7.447	6.137	6.083	6.590	9.125	14.295	3.153	1.659	662	4.073	1.967	779	2.002	13.083
5	44.043		44.043		20.872	3.229	5.591	604	756	5.505	5.187	23.171	2.159	1.668	123	2.244	11.602	967	4.408	
15	78.763		78.763		31.513	5.918	8.254	1.204	1.277	7.792	7.068	47.250	10.742	5.421	660	8.631	9.758	4.826	7.212	
25	73.095		73.095		22.502	3.756	5.627	1.172	1.918	5.562	4.468	50.592	21.632	6.919	1.442	10.860	2.034	3.359	4.346	
35	72.661		72.661		24.956	2.629	5.433	2.079	2.585	6.079	6.151	47.706	18.623	5.944	3.076	11.090	1.514	1.636	5.824	
45	73.933		73.933		25.499	5.116	5.859	2.342	2.455	5.376	4.351	48.434	20.504	4.961	5.027	9.975	1.300	761	5.907	
55	51.841		51.841		17.952	5.318	5.517	2.022	1.041	1.461	2.593	33.889	12.840	3.640	3.544	7.663	293	749	5.158	
65	26.618		26.618		12.149	3.856	4.702	1.960	877	180	574	14.470	5.233	1.974	1.292	3.871		104	1.996	
75	17.626		17.626		11.807	5.827	2.923	1.114	596	493	854	5.819	1.233	1.115	545	2.338		29	558	
85	11.861		11.861		10.133	5.605	2.037	1.200	596	104	591	1.728	524	234	161	661			147	
95	9.207		9.207		8.216	5.812	1.639	487	12		266	991	161	34		548			248	
105	9.137		9.137		7.563	5.936	1.098	509			20	1.574	209		104	1.157			104	
115	4.716		4.716		3.945	3.220	725					771	6			765				
125	5.038		5.038		4.934	3.713	1.221					104							104	
135	2.290		2.290		2.290	1.557	524	104			104									
145	3.696		3.696		3.696	3.356	341													
>150	3.973		3.973		3.869	2.895	940	35				104	104							

Tabel 2.5. Fordeling af skovarealet til arts- og aldersklasser for Region Hovedstaden. Bemærk at hver skovbevoksning er henført til én bestemt klasse, og at resultaterne derfor ikke er konsistente med artsfordelingen ovenfor.

Table 2.5. Distribution of the forest area to species and age classes for Region Hovedstaden. Note that each forest stand is attributed to a specific management class and the results are therefore not consistent with the species distribution above.

Alders-klasse Age class	**I alt** Total	**Hjælpe-arealer** Un-stocked	**Træbe-vokset** Wooded area	**Midler-tidigt ubevokset** Tempo-rarily unstocked	**Løv** Broad-leaves	**Bøg** Beech	**Eg** Oak	**Ask** Ash	**Ær** Syca-more maple	**Birk** Birch	**Andet løv** Other broad-leaves	**Nål** Coni-fers	**Rød-gran** Nor-way spruce	**Sitka-gran** Sitka spruce	**Andet ædel-gran** Other fir sp.	**Fyr** Pine sp.	**Nord-manns-gran** Nord-mann fir	**Nobi-lis** Noble fir	**Andet nål** Other conifers	**Ukendt** Unknown
År	ha																			
I alt Total	44.912	447	44.465	485	26.718	9.087	5.957	2.648	1.808	3.669	3.548	16.670	9.874	870	177	2.229	1.622	205	1.692	592
.	15.155	447	14.708	485	11.421	2.146	1.946	1.633	980	2.243	2.474	2.210	671	119		928	103		390	592
5	1.176		1.176		254	96	92			67		922	253	67		205	396			
15	3.595		3.595		1.401	177	670	170		179	205	2.194	676	205	103		689	205	316	
25	5.969		5.969		2.106	771	665		203	364	103	3.863	2.920	260	75	243	205		160	
35	4.134		4.134		2.196	500	467		163	615	450	1.938	933	131		383	230		261	
45	5.062		5.062		1.537	693	308	54	205	201	76	3.525	2.906	46		367			205	
55	2.152		2.152		1.136	469	205	240	51		171	1.017	718	42		103			154	
65	1.641		1.641		1.049	229	391	224	205			592	592							
75	1.167		1.167		1.065	677	387					103							103	
85	615		615		513		308	205				103	103							
95	661		661		558	360	127				71	103	103							
105	933		933		831	606	103	122				103							103	
115	289		289		289	205	84													
125	467		467		467	467														
135	383		383		383	383														
145	1.225		1.225		1.225	1.225														
>150	289		289		289	85	204													

Tabel 2.6. Fordeling af skovarealet til arts- og aldersklasser for Region Midtjylland. Bemærk at hver skovbevoksning er henført til én bestemt klasse, og at resultaterne derfor ikke er konsistente med træartsfordelingen ovenfor.

Table 2.6. Distribution of the forest area to species and age classes for Region Midtjylland. Note that each forest stand is attributed to a specific management class and the results are therefore not consistent with the species distribution above.

Aldersklasse Age class	**I alt** Total	**Hjælpearealer** Unstocked	**Træbevokset** Wooded area	**Midlertidigt ubevokset** Temporarily unstocked	**Løv** Broadleaves	**Bøg** Beech	**Eg** Oak	**Ask** Ash	**Ær** Sycamore maple	**Birk** Birch	**Andet løv** Other broadleaves	**Nål** Conifers	**Rødgran** Norway spruce	**Sitkagran** Sitka spruce	**Andet ædelgran** Other fir sp.	**Fyr** Pine sp.	**Nordmannsgran** Nordmann fir	**Nobilis** Noble fir	**Andet nål** Other conifers	**Ukendt** Unknown
År																				
I alt Total	207.511	2.753	204.758	4.268	69.585	16.772	17.957	4.204	4.260	13.539	12.853	127.827	47.249	11.351	5.870	26.887	9.839	6.710	19.921	3.077
.	26.519	2.753	23.767	4.268	9.128	1.540	2.241	837	750	1.836	1.924	7.293	1.147	982	389	2.792	833	398	754	3.077
5	13.576		13.576		6.152	892	1.401	309	103	1.472	1.975	7.424	665	364	103	622	3.562	230	1.878	
15	28.795		28.795		9.208	1.556	1.635			3.029	2.988	19.587	4.880	1.711	349	2.762	3.504	2.858	3.524	
25	28.177		28.177		7.241	1.287	2.138	95	337	1.825	1.559	20.936	8.545	2.893	457	4.671	910	1.468	1.993	
35	31.253		31.253		8.114	723	1.746	391	547	2.798	1.909	23.139	10.122	2.342	1.233	4.937	483	894	3.129	
45	29.940		29.940		7.434	1.013	2.245	175	779	1.568	1.654	22.507	10.144	1.219	1.403	5.064	453	431	3.792	
55	22.289		22.289		5.642	1.264	2.525	481	462	628	282	16.647	7.594	906	1.420	3.216	95	431	2.985	
65	10.069		10.069		3.704	907	1.245	595	492	177	288	6.364	2.793	670	403	1.178			1.319	
75	5.380		5.380		2.862	1.058	748	555	191	206	103	2.519	936	232	113	950			287	
85	4.887		4.887		4.361	2.088	1.000	515	588		171	525	161			365				
95	1.795		1.795		1.342	1.029	224	77	11			453	56	33		206			158	
105	1.640		1.640		1.414	859	381	174				226	103			123				
115	955		955		955	853	103													
125	652		652		549	476	74					103							103	
135	349		349		349	225	124													
145	450		450		450	450														
>150	783		783		680	553	126					103	103							

Tabel 2.7. Fordeling af skovarealet til arts- og aldersklasser for Region Nordjylland. Bemærk at hver skovbevoksning er henført til én bestemt klasse, og at resultaterne derfor ikke er konsistente med træartsfordelingen ovenfor.

Table 2.7. Distribution of the forest area to species and age classes for Region Nordjylland. Note that each forest stand is attributed to a specific management class and the results are therefore not consistent with the species distribution above.

Alders-klasse Age class	**I alt** Total	**Hjælpe-arealer** Un-stocked	**Træbe-vokset** Wooded area	**Midler-tidigt ubevokset** Tempo-rarily unstocked	**Løv** Broad-leaves	**Bøg** Beech	**Eg** Oak	**Ask** Ash	**Ær** Syca-more maple	**Birk** Birch	**Andet løv** Other broad-leaves	**Nål** Coni-fers	**Rød-gran** Nor-way spruce	**Sitka-gran** Sitka spruce	**Andet ædel-gran** Other fir sp.	**Fyr** Pine sp.	**Nord-manns-gran** Nord-mann fir	**Nobi-lis** Noble fir	**Andet nål** Other conifers	**Ukendt** Unknown
År										**ha**										
I alt Total	109.708	286	109.422	2.014	37.905	9.576	8.206	1.537	1.081	8.759	8.746	66.517	9.883	13.896	7.458	20.547	6.358	2.626	5.748	2.985
.	6.575	286	6.289	2.014	448	99	187			36	127	842	2	209		80	351	200		2.985
5	8.344		8.344		3.652	709	1.031		144	464	1.302	4.692	303	896	18	512	2.125	128	710	
15	14.674		14.674		5.872	860	1.696	129	106	1.227	1.854	8.802	780	2.103	39	1.971	2.328	823	758	
25	14.049		14.049		3.427	359	488		106	1.534	940	10.622	2.110	2.739	585	3.048	341	737	1.061	
35	14.500		14.500		4.658	300	894	256	278	1.648	1.283	9.842	1.789	2.199	836	2.960	497	419	1.142	
45	18.291		18.291		6.269	823	1.300	201	40	2.889	1.016	12.021	2.321	2.002	2.970	3.020	676	78	954	
55	12.222		12.222		3.368	878	695	169	106	568	953	8.854	1.315	1.748	1.724	3.127	41	211	688	
65	5.938		5.938		1.116	282	729	106				4.822	715	1.078	609	2.083			337	
75	5.415		5.415		2.664	1.062	315	44	302	287	653	2.751	183	790	407	1.286		30	55	
85	2.081		2.081		1.187	224	329	106		106	422	894	260	131	163	296			44	
95	1.166		1.166		822	385	156	211			70	344				344				
105	2.075		2.075		819	587		211			20	1.256	106		106	1.045				
115	1.219		1.219		445	258	187					775				775				
125	734		734		734	606	128													
135	564		564		564	353		106			106									
145	161		161		161	161														
>150	1.700		1.700		1.700	1.630	70													

Tabel 2.8. Fordeling af skovarealet til træarts- og aldersklasser for Region Sjælland. Bemærk ,at hver skovbevoksning er henført til én bestemt klasse, og at resultaterne derfor ikke er konsistente med træartsfordelingen ovenfor.

Table 2.8. Distribution of the forest area to tree species and age classes for Region Sjælland. Note that each forest stand is attributed to a specific management class and the results are therefore not consistent with the species distribution above.

Alders-klasse Age class	**I alt** Total	**Hjælpe-arealer** Un-stocked	**Træbe-vokset** Wooded area	**Midler-tidigt ubevokset** Tempo-rarily unstocked	**Løv** Broad-leaves	**Bøg** Beech	**Eg** Oak	**Ask** Ash	**Ær** Syca-more maple	**Birk** Birch	**Andet løv** Other broad-leaves	**Nål** Coni-fers	**Rød-gran** Nor-way spruce	**Sitka-gran** Sitka spruce	**Andet ædel-gran** Other fir sp.	**Fyr** Pine sp.	**Nord-manns-gran** Nord-mann fir	**Nobi-lis** Noble fir	**Andet nål** Other conifers	**Ukendt** Unknown
År	**ha**																			
I alt Total	87.799	582	87.218	1.963	60.250	25.021	12.095	5.911	6.182	3.823	7.220	22.222	9.712	1.104	1.322	1.640	4.257	1.084	3.103	2.783
.	35.362	582	34.780	1.963	26.752	9.875	2.808	3.499	3.967	2.328	4.275	3.283	1.160	161	259	201	619	172	712	2.783
5	3.961		3.961		1.681	326	494	25	101	302	434	2.279	126				1.852	101	201	
15	7.604		7.604		4.180	1.520	1.520	156	103	378	503	3.425	523	206	49	439	1.448	249	512	
25	7.029		7.029		2.548	551	825	488	113	251	320	4.482	3.170	254	74	69	101	402	412	
35	6.282		6.282		2.275	156	376	258	800	67	618	4.007	2.571	101	645	179	101	60	351	
45	6.058		6.058		3.380	719	572	337	796	497	459	2.677	1.593	296	210	286	87		206	
55	4.621		4.621		3.081	1.297	649	306	302		527	1.540	569		86	272	51	101	462	
65	2.456		2.456		2.112	983	782	284			63	344		88		194			63	
75	2.024		2.024		2.024	1.044	779	201												
85	1.696		1.696		1.595	1.142	201	252				101							101	
95	2.379		2.379		2.295	1.470	733	72			20	84							84	
105	1.635		1.635		1.635	1.374	261													
115	1.564		1.564		1.564	1.225	339													
125	2.045		2.045		2.045	1.263	782													
135	530		530		530	329	201													
145	1.589		1.589		1.589	1.260	328													
>150	965		965		965	486	445	34												

Tabel 2.9. Fordeling af skovarealet til træarts- og aldersklasser for Region Sydjylland. Bemærk, at hver skovbevoksning er henført til én bestemt klasse, og at resultaterne derfor ikke er konsistente med træartsfordelingen ovenfor.

Table 2.9. Distribution of the forest area to tree species and age classes for Region Sydjylland. Note that each forest stand is attributed to a specific management class and the results are therefore not consistent with the species distribution above.

Alders-klasse Age class	**I alt** Total	**Hjælpe-arealer** Un-stocked	**Træbe-vokset** Wooded area	**Midler-tidigt ubevokset** Tempo-rarily unstocked	**Løv** Broad-leaves	**Bøg** Beech	**Eg** Oak	**Ask** Ash	**Ær** Syca-more maple	**Birk** Birch	**Andet løv** Other broad-leaves	**Nål** Coni-fers	**Rød-gran** Nor-way spruce	**Sitka-gran** Sitka spruce	**Andet ædel-gran** Other fir sp.	**Fyr** Pine sp.	**Nord-manns-gran** Nord-mann fir	**Nobi-lis** Noble fir	**Andet nål** Other conifers	**Ukendt** Unknown
År	ha																			
I alt Total	135.677	3.287	132.390	4.201	66.521	21.130	15.599	6.633	4.753	9.453	8.953	57.992	20.180	6.574	1.842	12.884	6.411	2.588	7.514	3.675
.	12.145	3.287	8.858	4.201	542	109	105		222		106	440	109	177		14	32		109	3.675
5	17.439		17.439		9.405	1.238	2.654	276	422	3.306	1.509	8.034	830	360		938	3.720	523	1.663	
15	24.530		24.530		11.065	1.808	2.776	773	1.110	3.059	1.539	13.464	3.955	1.238	118	3.572	1.777	678	2.126	
25	18.028		18.028		7.289	773	1.507	594	1.196	1.632	1.587	10.740	4.825	786	259	2.913	483	757	717	
35	16.616		16.616		7.854	969	1.994	1.211	792	959	1.929	8.762	3.109	1.210	345	2.697	204	265	932	
45	14.686		14.686		6.985	1.902	1.452	1.627	618	222	1.164	7.701	3.465	1.452	473	1.239	86	257	730	
55	10.628		10.628		4.749	1.403	1.448	841	109	274	673	5.879	2.632	993	326	967	109		853	
65	6.598		6.598		4.204	1.465	1.576	760	177		226	2.394	1.141	145	293	435		109	271	
75	3.687		3.687		3.223	2.015	679	312	109		109	464	109	104	29	109			113	
85	2.572		2.572		2.464	2.171	185	109				109		109						
95	3.227		3.227		3.227	2.603	384	131			109									
105	2.897		2.897		2.897	2.546	351													
115	654		654		648	648						6	6							
125	1.101		1.101		1.101	884	217													
135	458		458		458	260	197													
145	196		196		196	196														
>150	215		215		215	139	76													

Tabel 2.10. Fordeling af skovarealet til regioner og forskellige typer ejerskab.

Table 2.10. Distribution of the forest area to regions and ownership.

Ejerskab Ownership	**Region** Region					
	Danmark	**Hovedstaden**	**Midtjylland**	**Nordjylland**	**Sjælland**	**Syddanmark**
			ha			
I alt Total	585.607	44.912	207.511	109.708	87.799	135.677
Privat Private	400.263	13.671	156.293	67.063	67.180	96.057
Fond eller stiftelse Foundations	21.955	1.264	5.603	3.947	9.093	2.050
Statsskov State forest	107.155	25.229	25.945	26.399	5.063	24.518
Anden statslig Other state owned	5.260	977	2.092	572	485	1.135
Anden offentlig Other public	23.861	2.741	9.718	4.782	1.270	5.350
Ukendt Unknown	27.112	1.030	7.860	6.946	4.709	6.567

Tabel 2.11. Vedmassen i skov og på andre træbevoksede arealer fordelt til regioner.

Table 2.11. Growing stock in forests and other wooded lands distributed to regions.

Region Region	**Skov** Forest		**Andet træbevokset areal** Other wooded land	
	1.000 m³	**m³/ha**	**1.000 m³**	**m³/ha**
Danmark	115.112	197	838	18
Hovedstaden	12.483	277	239	63
Midtjylland	37.723	181	203	12
Nordjylland	18.010	163	56	7
Sjælland	24.081	273	226	48
Syddanmark	22.815	167	114	8

Tabel 2.12. Vedmassen fordelt til regioner og arter (1.000 kubikmeter). Den gennemsnitlige vedmasse per hektar er angivet i kursiv.
Table 2.12. Growing stock distributed to regions and species (1,000 cubic meters o.b.). The average growing stock per hectare is provided in italics.

Art Species	Region Region					
	Danmark	**Hovedstaden**	**Midtjylland**	**Nordjylland**	**Sjælland**	**Syddanmark**
	1.000 m³ *(m³/ha)*					
I alt Total	115.112 *197*	12.483 *277*	37.723 *181*	18.010 *163*	24.081 *273*	22.815 *167*
Løvtræ Broadleaves	63.022 *239*	8.086 *292*	14.571 *204*	6.127 *156*	19.053 *312*	15.079 *234*
Bøg Beech	28.454 *377*	3.634 *419*	5.628 *357*	2.536 *290*	9.108 *394*	7.521 *391*
Eg Oak	11.773 *206*	1.513 *273*	3.151 *172*	957 *133*	3.338 *312*	2.793 *178*
Ask Ash	5.332 *273*	637 *275*	1.113 *279*	248 *206*	1.768 *290*	1.562 *262*
Ær Sycamore maple	5.001 *238*	520 *271*	1.257 *287*	248 *115*	1.893 *263*	1.053 *197*
Birk Birch	4.140 *112*	803 *203*	1.390 *111*	795 *92*	612 *156*	531 *65*
Andet løv Other broadleaves	8.321 *156*	979 *186*	2.032 *123*	1.343 *118*	2.333 *231*	1.618 *160*
Nåletræ Conifers	52.090 *181*	4.397 *277*	23.152 *183*	11.884 *182*	5.028 *232*	7.736 *129*
Rødgran Norway spruce	20.767 *223*	2.976 *323*	9.290 *205*	2.631 *271*	2.552 *280*	3.293 *166*
Sitkagran Sitka spruce	7.471 *217*	270 *290*	2.495 *207*	3.221 *239*	278 *225*	1.284 *179*
Andet ædelgran Other fir sp.	5.527 *336*	39 *186*	2.064 *340*	2.136 *317*	667 *471*	646 *307*
Fyrrearter Pine sp.	7.562 *115*	534 *232*	3.723 *135*	2.180 *104*	300 *171*	850 *61*
Nordmannsgran Nordmann fir	1.234 *45*	105 *80*	485 *51*	319 *54*	146 *33*	182 *30*
Nobilis Noble fir	1.919 *149*	0 *2*	1.006 *153*	350 *137*	149 *142*	425 *166*
Andet nål Other conifers	7.610 *201*	473 *274*	4.090 *211*	1.047 *175*	936 *351*	1.055 *127*

Tabel 2.13. Fordelingen af den samlede vedmasse til diameterklasser. Diameterklassen angiver træets diameter i brysthøjde (1,3 m over færdselsnivau) som midtpunktet af 10-cm klasser. Diameterklasserne angiver klassens midtpunkt.

Table 2.13. Distribution of total growing stock to diameter classes. Diameter classes are the diameter at breast height (1.3 m above ground) as midpoint of 10 cm classes. Diameter classes indicate the class midtpoint.

Diameter-klasse Diameter class	**I alt** Total	**Løv** Broad-leaves	**Bøg** Beech	**Eg** Oak	**Ask** Ash	**Ær** Syca-more	**Birk** Birch	**Andet løv** Other broad-leaves	**Nåle-træ** Coni-fers	**Rød-gran** Norway spruce	**Sitka-gran** Sitka spruce	**Andet ædel-gran** Other fir sp.	**Fyr** Pine sp.	**Nord-manns-gran** Nord-mann fir	**Nobilis** Noble fir	**Andet nål** Other broad-leaves
cm									**1.000 m³**							
Ialt Total	115.112	63.022	28.454	11.773	5.332	5.001	4.140	8.321	52.090	20.767	7.471	5.527	7.562	1.234	1.919	7.610
5	4.412	2.509	484	383	149	345	463	684	1.903	750	226	89	425	152	71	190
15	19.705	7.509	1.605	1.218	568	976	1.337	1.805	12.196	5.669	1.673	622	1.824	465	497	1.447
25	29.033	10.976	3.059	1.983	1.010	1.443	1.298	2.182	18.058	8.354	2.483	1.462	2.759	447	505	2.049
35	25.053	12.233	4.728	2.239	1.406	1.242	726	1.892	12.820	4.665	1.909	1.814	1.781	128	536	1.987
45	13.091	8.909	4.745	1.549	1.042	577	211	784	4.182	975	677	913	509	35	200	873
55	10.160	8.286	5.473	1.355	665	273	99	422	1.874	257	319	454	161	7	75	601
65	6.117	5.502	3.802	1.039	352	93	6	210	615	69	122	92	83		8	241
75	3.130	2.871	2.004	664	83	33		87	259	28	34	60	16		27	95
85	1.828	1.734	1.271	342	42	19		60	94			22	6			67
95	930	878	595	230	15			38	52		11					41
>100	1.653	1.615	686	771				158	38		17					20

Tabel 2.14. Fordelingen af vedmassen i region Hovedstaden til diameterklasser. Diameterklassen angiver træets diameter i brysthøjde (1,3 m over færdselsnivau) som midtpunktet af 10-cm klasser.

Table 2.14. Distribution of growing stock in region Hovedstaden to diameter classes. Diameter classes are the diameter at breast height (1.3 m above ground) as midpoint of 10 cm classes.

Diameter-klasse Diameter class	**I alt** Total	**Løv** Broad-leaves	**Bøg** Beech	**Eg** Oak	**Ask** Ash	**Ær** Syca-more	**Birk** Birch	**Andet løv** Other broad-leaves	**Nåle-træ** Coni-fers	**Rød-gran** Norway spruce	**Sitka-gran** Sitka spruce	**Andet ædel-gran** Other fir sp.	**Fyr** Pine sp.	**Nord-manns-gran** Nord-mann fir	**Nobilis** Noble fir	**Andet nål** Other broad-leaves
cm									**1.000 m³**							
Ialt Total	12.483	8.086	3.634	1.513	637	520	803	979	4.397	2.976	270	39	534	105	0	473
5	340	259	58	44	7	32	40	77	81	58	2	4	3	8	0	6
15	1.891	960	213	117	88	88	236	218	931	679	82	14	76	38	0	42
25	2.874	1.404	383	215	114	155	308	230	1.469	1.123	74	14	146	49		64
35	2.522	1.395	463	276	136	165	123	232	1.127	851	50	4	134	6		82
45	1.356	940	423	194	130	52	61	81	416	201	29	2	89	5		90
55	1.279	1.046	611	216	90	29	35	65	232	43	23		55			111
65	794	695	504	104	46			41	99	21	10		24			43
75	367	367	241	94	11			22								
85	389	383	298	71				14	6				6			
95	216	199	166	19	15				16							16
>100	457	437	274	163					20							20

Tabel 2.15. Fordelingen af vedmassen i region Midtjylland til diameterklasser. Diameterklassen angiver træets diameter i brysthøjde (1,3 m over færdselsnivau) som midtpunktet af 10-cm klasser.

Table 2.15. Distribution of growing stock in region Midtjylland to diameter classes. Diameter classes are the diameter at breast height (1.3 m above ground) as midpoint of 10 cm classes.

Diameter-klasse Diameter class	**I alt** Total	**Løv** Broad-leaves	**Bøg** Beech	**Eg** Oak	**Ask** Ash	**Ær** Syca-more	**Birk** Birch	**Andet løv** Other broad-leaves	**Nåle-træ** Coni-fers	**Rød-gran** Norway spruce	**Sitka-gran** Sitka spruce	**Andet ædel-gran** Other fir sp.	**Fyr** Pine sp.	**Nord-manns-gran** Nord-mann fir	**Nobilis** Noble fir	**Andet nål** Other broad-leaves
cm									**1.000 m³**							
Ialt Total	37.723	14.571	5.628	3.151	1.113	1.257	1.390	2.032	23.152	9.290	2.495	2.064	3.723	485	1.006	4.090
5	1.610	728	91	139	23	61	165	249	882	399	94	36	158	61	32	104
15	7.375	2.079	364	485	73	182	424	551	5.296	2.562	557	219	765	184	236	773
25	10.755	2.754	553	723	206	317	412	543	8.001	3.721	794	485	1.352	203	293	1.153
35	8.807	2.979	933	644	324	326	295	457	5.828	2.027	627	620	1.038	28	270	1.217
45	4.001	2.112	1.038	400	241	211	58	165	1.889	412	244	433	294	8	89	408
55	2.360	1.568	1.010	269	115	119	31	25	793	133	120	198	73		50	218
65	1.255	1.051	726	182	87	20	6	30	204	24	39	16	34		8	83
75	754	569	386	121	29	21		12	185	12	21	43	9		27	72
85	363	312	225	71	16				51			14				37
95	262	238	172	67					24							24
>100	181	181	130	51												

Tabel 2.16. Fordelingen af vedmassen i region Nordjylland til diameterklasser. Diameterklassen angiver træets diameter i brysthøjde (1,3 m over færdselsnivau) som midtpunktet af 10 cm-klasser.

Table 2.16. Distribution of growing stock in region Nordjylland to diameter classes. Diameter classes are the diameter at breast height (1.3 m above ground) as midpoint of 10 cm classes.

Diameter-klasse Diameter class	**I alt** Total	**Løv** Broad-leaves	**Bøg** Beech	**Eg** Oak	**Ask** Ash	**Ær** Syca-more	**Birk** Birch	**Andet løv** Other broad-leaves	**Nåle-træ** Coni-fers	**Rød-gran** Norway spruce	**Sitka-gran** Sitka spruce	**Andet ædel-gran** Other fir sp.	**Fyr** Pine sp.	**Nord-manns-gran** Nord-mann fir	**Nobilis** Noble fir	**Andet nål** Other broad-leaves
cm									**1.000 m³**							
Ialt Total	18.010	6.127	2.536	957	248	248	795	1.343	11.884	2.631	3.221	2.136	2.180	319	350	1.047
5	803	363	28	53	13	18	107	144	440	58	91	38	168	37	15	33
15	3.976	1.137	161	180	26	66	338	367	2.839	710	685	258	655	116	116	298
25	5.536	1.355	379	237	39	78	212	410	4.180	1.063	1.065	601	893	111	92	355
35	4.267	1.373	603	278	68	44	94	286	2.893	586	860	724	404	56	70	193
45	1.596	686	439	78	36	23	29	81	910	153	299	294	50		39	75
55	982	555	395	67	35	6	16	37	427	33	131	186	5		18	54
65	553	404	335	33	5	13		17	149	18	60	27	4			40
75	185	156	112	18	26				29	9	13	7				
85	37	37	24	13												
95	18	18	18													
>100	59	41	41						18		18					

Tabel 2.17. Fordelingen af vedmassen i region Sjælland til diameterklasser. Diameterklassen angiver træets diameter i brysthøjde (1,3 m over færdselsnivau) som midtpunktet af 10-cm klasser.

Table 2.17. Distribution of growing stock in region Sjælland to diameter classes. Diameter classes are the diameter at breast height (1.3 m above ground) as midpoint of 10 cm classes.

Diameter-klasse Diameter class	**I alt** Total	**Løv** Broad-leaves	**Bøg** Beech	**Eg** Oak	**Ask** Ash	**Ær** Syca-more	**Birk** Birch	**Andet løv** Other broad-leaves	**Nåle-træ** Coni-fers	**Rød-gran** Norway spruce	**Sitka-gran** Sitka spruce	**Andet ædel-gran** Other fir sp.	**Fyr** Pine sp.	**Nord-manns-gran** Nord-mann fir	**Nobilis** Noble fir	**Andet nål** Other broad-leaves
cm									**1.000 m³**							
Ialt Total	24.081	19.053	9.108	3.338	1.768	1.893	612	2.333	5.028	2.552	278	667	300	146	149	936
5	804	691	225	65	65	152	54	130	114	59	3	5	8	23	5	12
15	2.807	1.800	546	154	217	349	171	363	1.007	664	59	55	30	68	42	88
25	4.687	3.066	1.076	325	346	600	190	530	1.621	1.033	98	153	70	39	39	187
35	5.003	3.666	1.550	556	427	454	138	540	1.338	643	86	255	88	9	26	230
45	3.333	2.794	1.438	447	347	213	47	302	539	121	22	122	56	6	36	176
55	2.789	2.530	1.587	414	245	74	12	199	259	33	9	33	23			161
65	1.936	1.842	1.148	488	102	33		71	94			26	19			49
75	1.095	1.059	781	230	7			42	36			9	6			21
85	614	593	455	99	11	18		10	21			8				12
95	242	242	161	45				36								
>100	770	770	141	516				112								

Tabel 2.18. Fordelingen af den samlede vedmasse til diameterklasser. Diameterklassen angiver træets diameter i brysthøjde (1,3 m over færdselsnivau) som midtpunktet af 10-cm klasser. Diameterklasserne angiver klassens midtpunkt.

Table 2.18. Distribution of growing stock in region Sydjylland to diameter classes. Diameter classes are the diameter at breast height (1.3 m above ground) as midpoint of 10 cm classes.

Diameter-klasse Diameter class	**I alt** Total	**Løv** Broad-leaves	**Bøg** Beech	**Eg** Oak	**Ask** Ash	**Ær** Syca-more	**Birk** Birch	**Andet løv** Other broad-leaves	**Nåle-træ** Coni-fers	**Rød-gran** Norway spruce	**Sitka-gran** Sitka spruce	**Andet ædel-gran** Other fir sp.	**Fyr** Pine sp.	**Nord-manns-gran** Nord-mann fir	**Nobilis** Noble fir	**Andet nål** Other broad-leaves
cm									**1.000 m³**							
Ialt Total	22.815	15.079	7.521	2.793	1.562	1.053	531	1.618	7.736	3.293	1.284	646	850	182	425	1.055
5	861	462	77	82	40	80	100	83	399	179	39	7	94	24	19	37
15	3.699	1.526	312	286	162	292	168	306	2.174	1.056	307	80	315	59	105	252
25	5.211	2.375	658	487	304	283	171	471	2.836	1.410	481	218	309	44	82	292
35	4.439	2.796	1.173	482	452	243	72	373	1.643	539	304	217	114	32	176	261
45	2.792	2.370	1.414	430	287	73	16	151	422	83	88	62	16	16	36	120
55	2.758	2.600	1.891	390	178	44	4	94	158	13	39	38	2	7	7	51
65	1.572	1.504	1.093	223	112	25		50	68	5	14	23				26
75	717	709	475	200	11	12		11	7	7						
85	416	399	259	88	15			37	17							17
95	187	175	74	102					12		12					
>100	162	162	95	23				44								

Tabel 2.19. Vedmassen i de danske skove fordelt til regioner og ejerformer. Gennemsnitlig vedmasse per ha er angivet med kursiv.
Table 2.19 . Growing stock distributed to regions and owner types. Average growing stock per hectare is provided in italics.

	Region Region					
Ejerform	**Danmark**	**Hovedstaden**	**Midtjylland**	**Nordjylland**	**Sjælland**	**Syddanmark**
Ownership			**1.000 m³** *(m³/ha)*			
I alt	115.112	12.483	37.723	18.010	24.081	22.815
Total	*197*	*277*	*181*	*163*	*273*	*167*
Privat	80.230	3.282	28.900	11.595	19.541	16.912
Private	*200*	*239*	*184*	*172*	*290*	*175*
Fond eller stiftelse	4.889	329	850	771	2.571	299
Foundations	*220*	*259*	*151*	*194*	*282*	*145*
Statsskov	22.619	7.810	5.241	3.832	1.462	4.315
State forest	*212*	*308*	*201*	*145*	*287*	*175*
Anden statslig skov	860	218	229	97	122	195
Other state owned	*163*	*223*	*109*	*169*	*250*	*171*
Anden offentlig skov	4.905	660	1.978	924	292	1.076
Other public	*206*	*240*	*203*	*192*	*229*	*200*
Ukendt	1.610	183	526	793	94	19
Unknown	*59*	*177*	*67*	*114*	*20*	*3*

Tabel 2.20. Vedmassen i de danske skove fordelt til ejerformer og træarter. Gennemsnitlig vedmasse per ha er angivet med kursiv.
Table 2.20 . Growing stock distributed to owner types and tree species. Average growing stock per hectare is provided in italics.

Art Species	I alt Total	Privat Private	Fond eller stiftelse Foundations	Statsskov State forest	Anden statslig skov Other state owned	Anden offentlig skov Other public	Ukendt Unknown
				1.000 m³ *(m³/ha)*			
I alt	115.112	80.230	4.889	22.619	860	4.905	1.610
Total	*197*	*200*	*220*	*212*	*163*	*206*	*59*
Løvtræ	63.022	46.042	3.054	9.896	473	2.942	615
Broadleaves	*239*	*236*	*248*	*268*	*169*	*214*	*219*
Bøg	28.454	19.447	1.575	5.781	155	1.152	343
Beech	*377*	*382*	*328*	*379*	*287*	*348*	*450*
Eg	11.773	8.609	599	1.881	109	497	79
Oak	*206*	*211*	*247*	*213*	*112*	*143*	*103*
Ask	5.332	4.247	259	414	40	270	102
Ash	*273*	*273*	*229*	*294*	*232*	*286*	*329*
Ær	5.001	3.754	301	612	42	264	29
Sycamore maple	*238*	*234*	*254*	*280*	*280*	*204*	*203*
Birk	4.140	2.966	125	718	27	271	34
Birch	*112*	*109*	*97*	*127*	*94*	*138*	*82*
Andet løv	8.321	7.019	195	489	100	489	29
Other broadleaves	*156*	*158*	*134*	*137*	*147*	*177*	*68*
Nåletræ	52.090	34.188	1.835	12.723	387	1.963	995
Conifers	*181*	*176*	*202*	*189*	*165*	*200*	*207*
Rødgran	20.767	13.734	1.007	4.986	153	630	256
Norway spruce	*223*	*211*	*263*	*252*	*192*	*238*	*270*
Sitkagran	7.471	4.737	334	1.869	67	121	342
Sitka spruce	*217*	*223*	*233*	*187*	*199*	*202*	*374*
Andet ædelgran	5.527	3.577	201	1.249	33	362	105
Other fir sp.	*336*	*349*	*395*	*293*	*256*	*378*	*295*
Fyr	7.562	4.422	55	2.407	71	495	112
Pine sp.	*115*	*120*	*62*	*106*	*114*	*129*	*101*
Nordmannsgran	1.234	1.042	3	150		16	23
Nordmann fir	*45*	*42*	*5*	*113*		*115*	*70*
Nobilis	1.919	1.652	12	234		17	4
Noble fir	*149*	*148*	*27*	*268*		*159*	*14*
Andet nål	7.610	5.024	221	1.829	62	321	152
Other conifers	*201*	*199*	*165*	*217*	*136*	*206*	*181*

Tabel 2.21. Kulstofpulje i træer fordelt på skove og andre træbevoksede arealer.

Table 2.21. Distribution of carbon in trees to regions in forests and other wooded lands.

Region Region	**Skov** Forest		**Andre træbevoksede arealer** Other wooded lands	
	1.000 tons	**tons/ha**	**1.000 tons**	**tons/ha**
Danmark	37.659	64	272	6
Hovedstaden	4.023	89	76	20
Midtjylland	12.292	59	67	4
Nordjylland	5.902	54	18	2
Sjælland	7.896	90	75	16
Syddanmark	7.546	55	35	3

Tabel 2.22. Kulstof i levende biomasse i skov fordelt på regioner og træarter (1.000 tons). Kulstofmængden per hektar er angivet i kursiv.
Table 2.22. Distribution of carbon in live biomass in forests to regions and tree species (1,000 tonnes). Carbon per hectare is provided in italics.

Art	Region					
	Danmark	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Sjælland	Syddanmark
	1.000 tons *(tons/ha)*					
I alt	37.659	4.023	12.292	5.902	7.896	7.546
Total	*64*	*89*	*59*	*54*	*90*	*55*
Løvtræ	21.323	2.728	4.936	2.110	6.414	5.134
Broadleaves	*81*	*99*	*69*	*54*	*105*	*80*
Bøg	9.935	1.266	1.979	897	3.152	2.631
Beech	*132*	*146*	*126*	*103*	*136*	*137*
Eg	4.184	534	1.121	343	1.183	996
Oak	*73*	*96*	*61*	*48*	*111*	*63*
Ask	1.810	216	378	85	598	532
Ash	*93*	*93*	*95*	*70*	*98*	*89*
Ær	1.492	154	376	75	564	313
Sycamore maple	*71*	*80*	*86*	*35*	*79*	*59*
Birk	1.338	257	449	260	197	171
Birch	*36*	*65*	*36*	*30*	*50*	*21*
Andet løv	2.599	302	633	450	720	490
Other broadleaves	*49*	*57*	*38*	*39*	*71*	*48*
Nåletræ	16.336	1.294	7.356	3.792	1.482	2.412
Conifers	*57*	*81*	*58*	*58*	*68*	*40*
Rødgran	5.895	806	2.703	747	674	959
Norway spruce	*63*	*87*	*60*	*77*	*74*	*48*
Sitkagran	2.159	73	716	949	78	365
Sitka spruce	*63*	*79*	*59*	*70*	*63*	*51*
Andet ædelgran	1.738	12	648	681	205	199
Other fir sp.	*106*	*59*	*107*	*101*	*145*	*94*
Fyr	2.884	206	1.424	826	116	321
Pine sp.	*44*	*90*	*52*	*39*	*66*	*23*
Nordmannsgran	422	36	166	109	50	62
Nordmann fir	*15*	*27*	*17*	*18*	*11*	*10*
Nobilis	656	0	344	120	51	145
Noble fir	*51*	*1*	*52*	*47*	*49*	*57*
Andet nål	2.546	161	1.355	359	308	360
Other conifers	*67*	*93*	*70*	*60*	*115*	*43*

Tabel 2.23. Hugsten i skove og plantager (Danmarks Statistik, Statistikbanken).

Table 2.23. Annual harvests in Danish forests and plantation (Statistics Denmark, Statistikbanken)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	1.000 m³									
Danmark Denmark										
Hugst i alt Total harvest	1.793	1.607	1.808	1.867	2.962	2.349	2.550	2.371	2.405	2.643
Gavntræ Timber	1.108	877	900	917	1.682	1.194	1.455	1.315	1.014	1.287
Brænde Firewood	425	405	438	428	472	409	377	309	352	374
Skovflis Wood chips	260	325								
Energitræ som flis Fuelwood, wood chips			326	372	420	468	501	564	784	776
Energitræ som rundtræ Fuelwood, roundwood			143	150	389	279	217	183	254	206
Øerne Islands										
Hugst i alt Total harvest	698	568	619	626	509	601	727	714	677	843
Gavntræ Timber	472	353	334	347	250	312	468	422	339	473
Brænde Firewood	195	181	219	209	186	193	168	158	176	196
Skovflis Wood chips	32	34								
Energitræ som flis Fuelwood, wood chips			22	28	25	33	37	65	90	109
Energitræ som rundtræ Fuelwood, roundwood			44	42	49	64	53	69	72	65
Jylland Jutland										
Hugst i alt Total harvest	1.094	1.039	1.189	1.241	2.453	1.748	1.823	1.657	1.728	1.800
Gavntræ Timber	636	523	566	570	1.432	882	987	893	674	814
Brænde Firewood	230	224	220	219	286	216	209	151	177	178
Skovflis Wood chips	229	292								
Energitræ som flis Fuelwood, wood chips			304	344	396	435	464	499	695	667
Energitræ som rundtræ Fuelwood, roundwood			99	108	340	215	163	114	182	141

3. Skovsundhed

Bedømmelser af træernes tab af nåle og blade er siden 1989 blevet anvendt som indikator for træernes sundhed. Værdien 0 pct. tab svarer til, at træet har fuldt løv og er i optimal sundhedstilstand, mens værdien 100 pct. betyder, at træet er helt afløvet. Træer med et nåle-/ bladtab på op til 25 pct. betragtes ikke som skadet, idet dette tab skønnes at ligge indenfor rammerne af træernes naturlige variation. Bedømmelsen af skovsundheden foretages dels på prøvefladerne i Danmarks Skovstatistik og dels på en række ældre prøveflader, der blev udlagt med henblik på bl.a. vurdering af skovsundheden.

Nåle-/bladtabet har for de mest almindelige danske træarter været aftagende gennem de sidste 15 år og er for nuværende på et meget lavt niveau (figur 3.1, figur 3.2, tabel 3.1). Ask er dog en undtagelse fra den generelle tendens. Årlige landsdækkende angreb af asketoptørre forårsaget af en aggressiv variant af svampen aske-stilkskive har medført en kraftig stigning i bladtabet hos ask i de seneste ti år. Også for sitkagran kan der observeres en stigning i det gennemsnitlige nåletab, specielt i 2008 som følge af omfattende angreb af sitkabladlus i 2007-2008, der har medført tab af ældre nåle. Desuden var sitkagran plaget af jættebarkbilleangreb i slutningen af perioden.

Der kan være forskelligartede årsager til, at træerne har lav beløvning. Tørre somre påvirker de fleste træarter, men især bøg er følsom på grundvandsnære jorder. Bladtab i eg er som regel forbundet med afløvning i forsommeren, når forskellige sommerfuglelarver spiser de nyudsprungne blade. Den største trussel mod rødgran er stormfald, stammeråd og barkbiller, men den sidstnævnte skade registreres sjældent ved vurdering af sundheden, fordi træerne som regel svækkes eller dør og fældes hurtigt.

Som helhed er sundheden i de danske skove meget tilfredsstillende, ikke mindst for perioden 2006-2010. For de fleste træarter har langt overvejende af de overvågede træer været sunde, dvs. haft under under 25 pct. nåle-/bladtab. Dog var beløvningen i sitkagran og ask så ringe, at hhv. 19 og 51 pct. af træerne må opfattes som skadede (tabel 3.2). Disse arters dårlige sundhedstilstand har medført, at især ask, men også sitkagran fældes i stort omfang. Den meget store afløvning observeret for ask skyldes dog delvis en meget stærk afløvning på en enkelt ældre prøveflade, hvor den gennemsnitlige afløvning var 94 pct. Den gennemsnitlige afløvning på Danmarks Skovstatistiks prøveflader alene var kun 26 pct.



Figur 3.1. Udvikling i nåle-/bladtab for løvtræarterne baseret på data fra Danmarks Skovstatistik og de ældre overvågningsprøveflader. Ær omfatter også enkelte andre løvtræer. Før 2003 er kurverne alene baseret på de oprindelige prøveflader fra 1989.

Figure 3.1. Development in average defoliation for broadleaved species. Based on data from the NFI data and data from older monitoring plots. Sycamore (Ær) includes a few other broadleaves. Before 2002 the curves are only based on the original monitoring plots from 1989.



Figur 3.2. Udvikling i nåle-/bladtab for nåletræarterne. Baseret på data fra Danmarks Skovstatistik og de ældre overvågningsprøveflader. Før 2002 er kurverne alene baseret på de oprindelige prøveflader. Der blev i 2007 vurderet så få træer i gruppen af andre nåletræarter, at resultatet ikke kan betragtes som repræsentativt og derfor er udeladt. Den markante nedgang i nåletab i fyr omkring 1996 skyldes bortfald af nogle ældre fyrrebevoksninger.

Figure 3.2. Development in average defoliation for conifer species, based on data from the NFI and older monitoring plots. In 2007 only few other conifers (Andre nåletræer) were monitored. Thus the observed average defoliation is considered to be uncertain and was left out. Before 2002 the curves are only based on the original monitoring plots.

3.1 Tabeller

Tabel 3.1. Gennemsnitligt nåle-/bladtab for de mest almindelige danske træarter gennem de seneste fem år, baseret på data fra skovstatistikken og de ældre overvågningsprøveflader. Andre nåletræer omfatter især ædelgranarter og lærk, men også douglasgran.

Table 3.1. Average defoliation for the most common Danish tree species during the last five years based on NFI data and some data from older plots.

Art Species	**Afløvning (pct.)** Defoliation				
	2006	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
Bøg Beech	9,8	9,8	8,7	9,3	7,9
Eg Oak	19,8	17,6	13,9	13,6	15,4
Ask Ash	20,5	33,8	33,1	41,7	39,6
Ær * Sycamore maple	3,0	6,4	6,2	4,7	5,8
Rødgran Norway spruce	8,2	7,3	8,7	6,3	6,1
Sitkagran Sitka spruce	10,9	10,0	20,0	13,4	12,8
Fyrrearter Pine sp.	8,1	7,4	12,8	11,9	14,3
Andet nål Other conifers	12,5	0,8	10,1	8,5	5,5

** Enkelte andre løvtræarter indgår. Including some other broadleaves.*

Tabel 3.2. Træernes fordeling (i pct.) til enkelte afløvningsklasser for forskellige træarter (gennemsnit for skovstatistikken 2006-2010). Hvor afløvningen overstiger 25 pct., opfattes træet som skadet.

Table 3.2. Distribution of trees (in percent) to different defoliation-classes for different tree species (average for the NFI inventory years 2006-2010). Where defoliation is more than 25 pct., trees are considered damaged.

Afløvning (pct.) Defoliation	**Art** Species							
	Bøg Beech	**Eg** Oak	**Ask** Ash	**Ær** * Sycamore maple	**Rødgran** Norway spruce	**Sitkagran** Sitka spruce	**Fyrrearter** Pine sp.	**Andet nål** Other conifers
0-25	91	79	49	97	92	81	88	90
25-50	8	18	27	2	7	15	11	9
50-75	0	1	9	1	1	2	1	0
75-100	0	1	14	0	1	2	0	1

** Enkelte andre løvtræarter indgår. Including some other broadleaves.*

4. Biodiversitet i de danske skove

De danske skove indeholder levesteder for en stor mængde organismer og udgør således grundlaget for en væsentlig del af Danmarks samlede biodiversitet. Skovene har særlig betydning, fordi Danmark oprindeligt er et skovland. Derfor hører en stor del af de vilde dyr og planter i vore dages danske natur til i skovene.

Skovenes biodiversitet kan karakteriseres ved deres sammensætning af arter, deres struktur og funktion. Den samlede biologiske diversitet er afhængig af træarterne, skovdyrkningen, forekomsten af store træer, tilstedeværelsen og mængden af dødt ved samt af bevoksningens historie.

4.1 Biodiversitet og skovdyrkning

De mest betydende elementer for skovenes biodiversitet er valget af træart og skovens dyrkning. Generelt vil en bred vifte af træarter betyde, at biodiversiteten forøges dels som en direkte følge af den større mængde arter, men også indirekte som følge af at et større antal træarter frembyder flere levesteder for skovens dyr og planter. I de danske skove er der generelt mange forskellige træarter, og der blev på skovstatistikkens prøveflader registreret 58 forskellige arter i måleperioden 2006-2010.



Figur 4.1. Andelen af hjemmehørende træarter i landets kommuner.

Figure 4.1. The proportion of indigenous tree species in the Danish forests.

Af det samlede skovareal er 48 pct. dækket af hjemmehørende arter, mens 45 pct. er dækket af ikke-hjemmehørende arter (resten er ukendt, midlertidigt ubevokset eller hjælpearealer i skov). Dette har betydning for biodiversiteten, fordi flere organismer i reglen er knyttet til de hjemmehørende arter end til de ikke-hjemmehørende. Andelen af hjemmehørende arter er størst i de gamle skovegne i den østlige del af landet (figur 4.1).

De danske skove dyrkes overvejende i ensaldrende bevoksninger, der er etableret ved plantning (66,0 pct.) eller naturlig foryngelse (9,1 pct.) (figur 4.2). Uensaldrende skov udgør tilsammen 12,1 pct. af det samlede skovareal, fordelt på forstligt drevne skove (5,8 pct.) og naturskove (6,3 pct.). Af det samlede skovareal er 35 pct. dækket med blandet skov, defineret som skov med mere end 25 pct. kronedække af en anden art en hovedtræarten.

Den store andel af ensaldrende bevoksninger har stor betydning for biodiversiteten i de danske skove, da de ensartede bevoksninger har et begrænset udbud af levesteder for dyr og planter. Desuden medfører den forstlige praksis med at fjerne hele bevoksningen for herefter at gentilplante arealet et tab af levesteder for organismer, der stiller krav til et kontinuerligt skovdække over lange perioder.



Figur 4.2. Fordeling af skovarealet til forskellige driftsformer.

Figure 4.2. Distribution of the forest area to management types.

4.2 Gamle træer og dødt ved

Gamle træer har betydning for biodiversiteten af flere årsager. For det første rummer et gammelt og derfor stort træ flere levesteder for dyr og planter end et lille træ. Ydermere vidner gamle og store træer om stor kontinuitet i skovdækket, hvilket mange arter tilknyttet skov er afhængig af. Endelig opstår der i gamle træer ofte hulheder og begyndende nedbrydning af træet, hvilket giver eksistensmuligheder for en lang række organismer.

I Danmark er der i gennemsnit 18,2 store træer per hektar (her defineret som træer, hvor stammens diameter overstiger 40 cm 1,3 meter over jorden). Det er således kun lidt over 1 pct. af træerne, der kan karakteriseres som store.

Skovenes døde ved udgør livsgrundlaget for mange arter af nedbrydere og deres prædatorer. Undersøgelser gældende for Sverige viser, at omtrent 1/3 af de skovlevende organismer er afhængige af dødt ved. I den danske liste over truede arter (rødlisten) fremhæves dødt ved som en biotop, hvor der er en stor andel af truede arter. Mere dødt ved i skovene vil således bidrage til at bevare og øge biodiversiteten i skovene.

I Danmark er den gennemsnitlige døde vedmasse 5,4 kubikmeter per hektar. Af den døde vedmasse er 3,9 kubikmeter stående, mens 1,5 kubikmeter ligger ned. Der er ikke nævneværdige forskelle mellem mængden af dødt ved i private og offentlige skove.

4.3 Tabeller

Tabel 4.1. De 20 mest almindelige træarter i de danske skove (ud fra deres estimerede andel af kronedækket).
Table 4.1. The 20 most common tree species in Danish forest according to their estimated share of the canopy cover.

Art Species	**Andel** Percentage	**Areal** Area	**Art** Species	**Andel** Percentage	**Areal** Area
	%	**ha**		**%**	**ha**
Rødgran	15,9	93.002	Ask	3,3	19.540
Bøg	12,9	75.551	Bjergfyr[4]	2,8	16.552
Sitkagran	5,9	34.498	Nobilis	2,2	12.916
Skovfyr	5,5	32.058	Rødel	2,1	12.258
Eg[1]	5,4	31.604	Alm. ædelgran	1,9	11.133
Birk[2]	5,3	30.823	Contortafyr	1,7	10.241
Nordmannsgran	4,7	27.355	Pil[5]	1,1	6.427
Stilkeg	3,6	21.354	Douglasgran	1,0	5.991
Ær	3,6	21.016	Røn	0,9	5.533
Lærk[3]	3,5	20.586	Grandis	0,9	5.317

[1] Omfatter stilkeg og vintereg, [2] Omfatter vortebirk og dunbirk, [3] Omfatter europæisk lærk og japansk lærk samt krydsninger af disse (hybridlærk), [4] Omfatter bjergfyr og fransk bjergfyr, [5] omfatter alle træagtige arter af pil, dog i hovedsagen seljepil.

Tabel 4.2. Fordeling af skovarealet til skove med og uden indblanding af andre arter end hovedtræarten. Skove opfattes som blandede, når der er mere end 25 pct. af en anden art end hovedtræarten bedømt ud fra stammernes samlede tværsnitsareal.
Table 4.2. Distribution of the forest area to forests to monospecific (distributed to broadleaves and conifers) and mixed forest. Forests are considered mixed when there is more than 25 pct. of another species than the main species based on stem cross-sectional area.

Skovtype Forest type	**Region** Region					
	Danmark	**Hovedstaden**	**Midtjylland**	**Nordjylland**	**Sjælland**	**Syddanmark**
			ha			
I alt Total	585.607	44.912	207.511	109.708	87.799	135.677
Løvtræ Broadleaves	138.996	16.098	33.353	20.659	34.769	33.716
Nåletræ Conifers	209.193	12.443	88.544	48.803	16.622	43.098
Blandet Mixed forest	205.143	15.003	76.069	34.988	31.399	47.587
Ubevokset Unstocked	32.274	1.368	9.545	5.258	5.008	11.276

Tabel 4.3. Fordelingen af skovarealet til regioner og driftsformer.

Table 4.3. Distribution of the forest area to different regions and management types.

Driftsform Management type	**Region** Region					
	Danmark	**Hovedstaden**	**Midtjylland**	**Nordjylland**	**Sjælland**	**Syddanmark**
			ha			
I alt Total	585.607	44.912	207.511	109.708	87.799	135.677
Ensaldrende, plantning Evenaged, planted	386.706	33.476	146.046	71.691	61.760	72.724
Ensaldrende, naturlig foryngelse Evenaged, natural regeneration	53.284	641	11.094	1.084	1.914	39.933
Uensaldret, drift Unevenaged, operational	34.019	3.478	11.160	5.801	8.545	4.773
Uensaldret, naturskov Unevenaged, nature	36.992	5.247	11.576	9.418	7.291	3.192
Gammel driftsform Ancient management forms	6.381	103	2.760	1.732		1.843
Værnskov Protective forest	14.057		7.304	2.892		3.957
Andet Other	24.637	698	7.885	12.519	3.443	
Ukendt Unknown	29.531	1.269	9.687	4.571	4.845	9.255

Tabel 4.4. Fordeling af skovarealet til ejerformer og driftsformer.

Table 4.4. Distribution of the forest area to forms of ownership and types of management.

Driftsform Management type	**Ejerform** **Form of ownership**						
	I alt Total	**Privat** Private	**Fond eller stiftelse** Foundations	**Statsskov** State forest	**Anden statslig** Other state owned	**Anden offentlig** Other public	**Ukendt** Unknown
				ha			
I alt Total	585.607	400.401	22.258	106.806	5.270	23.811	27.061
Ensaldrende, plantning Evenaged, planted	386.706	265.526	15.856	80.965	3.510	15.154	5.695
Ensaldrende, naturlig foryngelse Evenaged, natural regeneration	53.284	38.051	572	10.632	532	3.084	413
Uensaldret, drift Unevenaged, operational	34.019	25.067	1.869	5.371	538	977	198
Uensaldret, naturskov Unevenaged, nature	36.992	28.691	1.804	3.662	333	2.294	209
Gammel driftsform Ancient management forms	6.381	5.103	219	649		246	164
Værnskov Protective forest	14.057	11.662	218	1.015	189	891	82
Andet Other	24.637	19.323	1.213	2.495	154	1.034	417
Ukendt Unknown	29.531	6.979	508	2.016	14	130	19.884

Tabel 4.5. Død vedmasse fordelt til typer af dødt ved (stående, hældende, liggende) og artsgrupper (løv- og nåletræ).

Table 4.5. Deadwood distributed to types (standing, leaning and lying) and species types (broadleaved and conifers).

Type Type	**I alt** Total	**Stående** Standing	**Hældende** Leaning	**Liggende** Lying
		1.000 m³ *(m³/ha)*		
I alt	3.156	1.929	351	877
Total	*5,4*	*3,3*	*0,6*	*1,5*
Nåletræ	1.092	679	85	328
Conifers	*1,9*	*1,2*	*0,1*	*0,6*
Løvtræ	2.065	1.250	266	549
Broadleaves	3,5	2,1	0,5	0,9
Ukendt	0			0
Unknown	*0,0*			*0,0*

Tabel 4.6. Dødt ved fordelt til typer (stående, hældende og liggende) og regioner. Dødt ved per hektar er angivet med kursiv.

Table 4.6. Dead wood volume distributed to different types (standing, leaning and lying) and regions. Dead wood per hectare is provided in italics.

Type Type	**Region** Region					
	Danmark	**Hovedstaden**	**Midtjylland**	**Nordjylland**	**Sjælland**	**Syddanmark**
			1.000 m³ *(m³/ha)*			
I alt	3.156	359	1.087	761	548	402
Total	*5,4*	*7,7*	*5,8*	*7,1*	*6,5*	*2,9*
Stående	1.929	179	683	469	341	259
Standing	*3,3*	*4,0*	*3,3*	*4,3*	*3,9*	*1,9*
Hældende	351	19	116	163	22	34
Leaning	*0,6*	*0,4*	*0,6*	*1,5*	*0,2*	*0,2*
Liggende	877	161	288	129	186	109
Lying	*1,5*	*3,6*	*1,4*	*1,2*	*2,1*	*0,8*

Tabel 4.7. Fordeling af den døde vedmasse til regioner og driftsformer. Den døde vedmasse per hektar er anført i kursiv.

Table 4.7. Distribution of deadwood volume to regions and management types. Volumes per hectare are provided in italics.

Driftsform Management type	**Region** Region					
	Danmark	**Hovedstaden**	**Midtjylland**	**Nordjylland**	**Sjælland**	**Syddanmark**
			1.000 m³ *(m³/ha)*			
I alt Total	3.156 *5,4*	359 *7,7*	1.087 *5,8*	761 *7,1*	548 *6,5*	402 *2,9*
Ensaldrende, plantning Evenaged, planted	2.137 *5,5*	284 *8,4*	725 *4,9*	558 *7,7*	416 *6,7*	147 *2,0*
Ensaldrende, naturlig foryngelse Evenaged, natural regeneration	202 *3,8*	1 *2,3*	41 *3,7*	4 *3,5*	2 *1,2*	161 *4,0*
Uensaldret, drift Unevenaged, managed	202 *5,9*	21 *6,1*	87 *7,8*	44 *7,6*	31 *3,6*	18 *3,7*
Uensaldret, naturskov Unevenaged, nature	358 *9,7*	52 *9,8*	125 *10,7*	80 *8,4*	80 *10,9*	20 *6,2*
Gammel driftsform Ancient management forms	50 *7,9*	- -	22 *7,8*	4 *2,4*	- -	26 *13,9*
Værnskov Protective forest	71 *5,0*	-	30 *4,0*	24 *8,2*	-	18 *4,6*
Andet Other	85 *3,5*	0 *0,5*	26 *3,3*	40 *3,2*	18 *5,3*	-
Ukendt Unknown	51 *1,7*	0 *0,2*	31 *3,2*	7 *1,4*	1 *0,3*	12 *1,3*

Tabel 4.8. Fordeling af den døde vedmasse til regioner og arealanvendelsesklasser. Død vedmasse per hektar er angivet i kursiv.

Table 4.8. Dead wood volume distributed to regions and landuse classes. Volumes per hectare are provided in italics.

Arealanvendelse Landuse	**Region** Region					
	Danmark	**Hovedstaden**	**Midtjylland**	**Nordjylland**	**Sjælland**	**Syddanmark**
			1.000 m³ *(m³/ha)*			
I alt Total	3.156 *5,4*	359 *7,7*	1.087 *5,8*	761 *7,1*	548 *6,5*	402 *2,9*
Skov, nål Forest, conifers	1.542 *6,7*	126 *9,8*	630 *6,1*	464 *8,9*	213 *13,8*	108 *2,3*
Skov, løv Forest, broadleaves	1.142 *4,8*	188 *7,4*	252 *4,3*	168 *5,0*	301 *5,1*	231 *3,8*
Skov, blandet løv og nål Forest, mixed conifers and broadleaves	419 *6,0*	44 *9,1*	174 *6,3*	122 *7,4*	33 *4,2*	47 *3,4*
Juletræer Christmas trees	6 *0,2*		5 *0,5*			1 *0,2*
Midlertidigt ubevokset Temporarily unstocked	29 *2,3*		25 *5,8*	1 *0,3*	1 *0,6*	2 *0,6*
Hjælpearealer Unstocked	18 *2,4*			6 *20,3*		12 *3,8*

Tabel 4.9. Dødt ved fordelt til regioner og typer af ejerskab. Dødt ved per hektar er angivet i kursiv.

Table 4.9. Dead wood volume distributed to regions and ownership classes. Dead wood per hectare is provided in italics.

Ejer Owner	**Region** Region					
	Danmark	**Hovedstaden**	**Midtjylland**	**Nordjylland**	**Sjælland**	**Syddanmark**
			1.000 m³ *(m³/ha)*			
I alt	3.156	359	1.087	761	548	402
Total	*5,4*	*7,7*	*5,8*	*7,1*	*6,5*	*2,9*
Privat	2.295	123	875	523	477	296
Private	*5,7*	*9,0*	*5,6*	*7,8*	*7,1*	*3,1*
Fond eller stiftelse	106	8	35	29	32	1
Foundations	*4,7*	*6,3*	*6,1*	*7,3*	*3,5*	*0,7*
Statsskov	583	207	112	164	30	72
State forest	*5,5*	*8,2*	*4,3*	*6,2*	*5,9*	*2,9*
Anden statslig	21	4	11	1	4	2
Other state owned	*4,0*	*3,9*	*5,1*	*1,9*	*7,5*	*1,5*
Anden offentlig	113	17	44	28	6	19
Other public	*4,7*	*6,1*	*4,5*	*5,8*	*4,6*	*3,5*
Ukendt	39	0	11	16	0	12
Unknown	*1,4*	*0,2*	*1,4*	*2,2*	*0,0*	*1,9*

SKOV & LANDSKAB

Skove og plantager 2010

De danske skove har mange forskelligartede funktioner og opfylder derfor mange behov for samfundet. Skovene leverer træ til industrien og brændeovnen, indeholder en væsentlig del af den danske natur og tilbyder samtidig oplevelser til befolkningen. Skovenes mangfoldige funktioner medfører, at der er en stor opmærksomhed på deres artssammensætning, struktur, udvikling og anvendelse. Denne skovstatistik er en opdatering af Skove og plantager 2006.

Skove og plantager 2010 indeholder oplysninger om skovenes areal og vedmasse samt skovenes sundhed.

Danmarks Skovstatistik udføres af Skov & Landskab, Københavns Universitet for Naturstyrelsen, Miljøministeriet.

Publikationen Skove og plantager 2010 er gennemført ved et samarbejde mellem Skov & Landskab og Naturstyrelsen.

Skov & Landskab
Københavns Universitet
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C
Tel. 3533 1500
sl@life.ku.dk
www.sl.life.ku.dk

Nationalt center for
forskning, uddannelse og
rådgivning i skov
og skovprodukter,
landskabsarkitektur og
landskabsforvaltning,
byplanlægning og bydesign